

Abrobion®

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΑΜΒΡΟΞΟΛΗ

Σιρόπι 15mg/5ml & 30mg/5ml

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απειθυνηθείτε στο φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
- Πρέπει να απειθυνηθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεσθε καλύτερα ή εάν αισθάνεσθε χειρότερα μετά από 4-5 ημέρες.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Abrobion και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Abrobion
3. Πώς να πάρετε το Abrobion
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Abrobion
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Abrobion και ποια είναι η χρήση του

Το Abrobion περιέχει τη δραστική ουσία υδροχλωρική αμβροξόλη και ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται βλενωλυτικά. Η υδροχλωρική αμβροξόλη έχει δείξει ότι αυξάνει τις εκκρίσεις του αναπνευστικού. Ενααίσει την παραγωγή του επιφανειοδραστικού παράγοντα των πνευμόνων και την λειτουργία των κροσσών. Αυτές οι δράσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ροής και της μεταφοράς της βλέννης (βλενοκροσσωτή κόθαρση). Η αύξηση των εκκρίσεων και της βλενοκροσσωτής κόθαρσης διευκολύνουν την απόχρεμψη και ανακουφίζουν το βήχα.

Το Abrobion λόγω της σύνθεσής του είναι κατάλληλο για διαβητικούς.

Το Abrobion σιρόπι χρησιμοποιείται σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών ως βοηθητικό για τη ρευστοποίηση των βλενωδών εκκρίσεων της αναπνευστικής οδού σε περιπτώσεις οξείων και χρόνιων βρογχοπνευμονικών παθήσεων (βρογχίτιδα, εμφύσημα, τραχειοβρογχίτιδα, χρόνια ασηματική βρογχίτιδα). Επίσης ενδείκνυται για την πρόληψη των αναπνευστικών επιπλοκών από κατακράτηση των εκκρίσεων μετά από μεζώνες χειρουργικής επεμβάσεως στο θώρακα – άνω κοιλία και μετά από μακροχρόνια κατάληξη. Κατά τη διάρκεια οξείων εξορών των βρογχίτιδων πρέπει να χορηγείται μαζί με το κατάλληλο αντιβιοτικό. Πρέπει να απειθυνηθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεσθε καλύτερα ή εάν αισθάνεσθε χειρότερα μετά από 4-5 ημέρες.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Abrobion.

Μην πάρετε το Abrobion

- Σε περίπτωση αλλεργίας στην υδροχλωρική αμβροξόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- Σε περίπτωση σπάνιων κληρονομικών καταστάσεων οι οποίες μπορεί να είναι μη συμβατές με κάποιο έλδοχο που περιέχεται στο φάρμακο, η χρήση του φαρμάκου αντενδείκνυται (βλέπε την παράγραφο «προιδοποιήσεις και προφυλάξεις»).
- Κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
- Να μην χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών.

Προιδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απειθυνηθείτε στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Abrobion εάν:

- έχετε ενεργό ή ιστορικό γαστρικού ή δωδεκαδακτυλικού έλκους
- είστε ασθματικός με ιστορικό βρογχόσπασμου ή βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια ή έχετε ενεργό φυματίωση
- έχετε σοβαρές ηπιατικές ή νεφρικές βλάβες

Σε περίπτωση επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας ή σοβαρής ηπιατόθειας το Abrobion μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από ιατρική συμβουλή. Κατά τη χρήση του φαρμάκου μπορεί να προκληθεί αύξηση του όγκου των ρευστοποιούμενων βρογχικών εκκρίσεων και αν δεν απομακρυνθούν με βήχα είναι προτιμότερο να διασωληνωθεί ο ασθενής ώστε να παραμείνει ανοικτή η αναπνευστική οδός. Το φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με αντιβιοτικά ή με φάρμακα που έχουν ατροπική δράση. Υπήρξαν αναφορές σοβαρών δερματικών αντιδράσεων που σχετίζονται με τη χορήγηση υδροχλωρικής αμβροξόλης. Εάν εμφανίσετε δερματικό εξάνθημα (συμπεριλαμβανομένων βλαβών στις βλενογονούς μεμβράνες όπως στο στόμα, το λαιμό, τη μύτη, τα μάτια, τα γεννητικά όργανα), σταματήστε τη χρήση υδροχλωρικής αμβροξόλης και επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας. Οι περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να εξηγηθούν από τη σοβαρότητα άλλων υποκείμενων ασθενειών και/ή συγχρησιμοποιούμενης φαρμακευτικής αγωγής. Επιπρόσθετα, κατά την πρώιμη φάση του συνδρόμου Steven Johnson ή της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει αρχικά μη εξειδικευμένα πρόδρομα συμπτώματα που να προσομοιάζουν με γρίπη, όπως πυρετός, πόνοι στο σώμα, ρινίτιδα, βήχας και πονόλαιμος. Αυτά τα μη εξειδικευμένα πρόδρομα συμπτώματα που προσομοιάζουν με γρίπη είναι πιθανόν να οδηγήσουν παραπλανητικά στην έναρξη συμπτωματικής αγωγής για το βήχα και το κρυολόγημα.

Παιδιά: Αντενδείκνυται η χορήγηση σε παιδιά κάτω των 2 ετών, διότι μπορεί να προκαλέσει βρογχική απόφραξη. Στα παιδιά ηλικίας από 2 έως 6 ετών θα πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη.

Άλλα φάρμακα και Abrobion: Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν υπάρχουν κλινικά σημαντικές δυσμενείς αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Η ταυτόχρονη χορήγηση της αμβροξόλης με αντιβιοτικά (αμοξικιλίνη, κεφουροξίμη, ερυθρομυκίνη, δοξικικιλίνη) οδηγεί σε υψηλότερες συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού στον πνευμονικό ιστό. Ταυτόχρονη χορήγηση ενός αντιβιοτικού αναστέλλει το αντανακλαστικό του βήχα και μπορεί να προκαλέσει στάση της ρευστοποιημένης λόγω της αμβροξόλης βλέννας.

Το Abrobion με τροφή: Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου είναι ανεξάρτητη από την πρόληψη τροφής. Ωστόσο συνιστάται να λαμβάνεται μετά τα γεύματα για την πρόληψη εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό σύστημα.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα: Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

Κύηση: Η αμβροξόλη διαπερνά τον πλακούντα. Δεν έχουν παρατηρηθεί επιβλαβείς επιδράσεις από τη χρήση της υδροχλωρικής αμβροξόλης κατά τη διάρκεια της κύησης. Ωστόσο, πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες προφυλάξεως σε σχέση με τη χρήση των φαρμάκων κατά την κύηση. Η χρήση του φαρμάκου **δεν συνιστάται** κατά τη διάρκεια της κύησης, ειδικά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης.

Θηλασμός: Η αμβροξόλη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Παρόλο που δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιδράσεις σε βρέφη που θηλάζουν, **δεν συνιστάται** η χορήγηση του φαρμάκου σε θηλάζουσες μητέρες.

Γονιμότητα: Μη κλινικές μελέτες δεν δείχνουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις σχετικά με τη γονιμότητα.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων: Δεν υπάρχουν ενδείξεις από δεδομένα μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου για την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Το σιρόπι Abrobion περιέχει σορβιτόλη και μενθόλη: Abrobion σιρόπι 30 mg/5ml: Το 5 ml σιροπιού περιέχει 1,6 g σορβιτόλης (E-420) που αντιστοιχεί σε 6,4 g σορβιτόλης ανά μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια

δόση (20 ml). Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Μπορεί επίσης να έχει ήπια καθαριστική δράση. **Abrobion σιρόπι 15 mg/5ml:** Τα 5 ml σιροπιού περιέχουν 1,6 g σορβιτόλης (E-420) που έχει ως αποτέλεσμα 9,6 g σορβιτόλης ανά μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια δόση (30 ml). Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Μπορεί επίσης να έχει ήπια καθαριστική δράση. Το **Abrobion σιρόπι 30mg/5ml & 15mg/5ml** περιέχει μενθόλη. Η μενθόλη μπορεί να προκαλέσει αντανακλαστική άπνοια και/ή λαρυγγόσπασμο (Kratschmer reflex) σε παιδιά κάτω των 2 ετών, όταν έρχεται σε επαφή με το ρινικό βλεννογόνο (ιδίαιτερα εάν το σιρόπι έρθει σε επαφή με το ρουθούνιο ή κοντά στην μύτη). Γι' αυτό δεν συνιστάται η χρήση του σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Σε περίπτωση παρ' όλα αυτά που εμφανιστούν τέτοια συμπτώματα θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή γιατρού αμέσως λόγω της πιθανής σοβαρότητάς τους.

3. Πώς να πάρετε το Abrobion: Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Σιρόπι 15 mg/5ml: Αν δεν υπάρχει άλλη οδηγία: Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: 30 mg (2 κουταλάκια του γλυκού ή 10 ml με το δοσμετρικό κουταλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία), 3 φορές την ημέρα. Παιδιά 6-12 ετών: 15 mg (1 κουταλάκι του γλυκού ή 5 ml με το δοσμετρικό κουταλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία), 2-3 φορές την ημέρα. Παιδιά 2-5 ετών: 7,5 mg (1/2 κουταλάκι του γλυκού ή 2,5 ml με το δοσμετρικό κουταλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία), 3 φορές την ημέρα.

1 κουταλάκι του γλυκού αντιστοιχεί σε 5 ml με το δοσμετρικό κουταλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. **Σιρόπι 30 mg/5ml:** Αν δεν υπάρχει άλλη οδηγία: Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: 30-60 mg (1-2 κουταλάκια του γλυκού ή 5-10 ml με το δοσμετρικό κουταλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία), 2 φορές την ημέρα. Παιδιά 6-12 ετών: 15 mg (1/2 κουταλάκι του γλυκού ή 2,5 ml με το δοσμετρικό κουταλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία), 2-3 φορές την ημέρα. Παιδιά 2-5 ετών: 7,5 mg (1/4 κουταλάκι του γλυκού ή 1,25 ml με το δοσμετρικό κουταλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία), 3 φορές την ημέρα. 1 κουταλάκι του γλυκού αντιστοιχεί σε 5 ml με το δοσμετρικό κουταλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Να λαμβάνεται με επαρκή ποσότητα υγρού (κατά προτίμηση με ένα ποτήρι νερό). Συνιστάται να λαμβάνεται μετά τα γεύματα. Μια αύξηση στη ροή των εκκρίσεων είναι αναμενόμενη. Συνιστάται να πίνετε άφθονα υγρά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Παιδιά: Αντενδείκνυται η χορήγηση σε παιδιά κάτω των 2 ετών, διότι μπορεί να προκαλέσει βρογχική απόφραξη. Στα παιδιά ηλικίας από 2 έως 6 ετών θα πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. **Διάρκεια της Θεραπείας:** Θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή του θεράποντος ιατρού εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν μετά από 4-5 ημέρες ή χειροτερεύουν κατά τη διάρκεια της αγωγής. **Επιπρόσθετες πληροφορίες για ειδικούς πληθυσμούς:** Το σιρόπι δεν περιέχει ζάχαρη και για αυτό είναι κατάλληλο για χορήγηση σε διαβητικούς και σε μικρά παιδιά. **Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Abrobion από την κανονική:** Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση από την κανονική, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσάρεστα συμπτώματα. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί εξειδικευμένα συμπτώματα υπερδοσολογίας στον άνθρωπο, παρά μόνο συμπτώματα σύμφωνα με τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες της υδροχλωρικής αμβροξόλης. Σε περίπτωση υπερβάσεως της δόσολογίας συνιστάται συμπτωματική θεραπεία. Μπορεί να προκληθεί αύξηση του όγκου των ρευστοποιημένων βρογχικών εκκρίσεων και αν δεν απομακρυνθούν με βήχα μπορεί να χρειαστεί ειδική υποστήριξη ώστε να παραμείνει ανοικτή η αναπνευστική οδός.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε Abrobion: Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παραλείψετε μία δόση, πρέπει να πάρετε τη δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Εάν, εν τούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες: Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 10 άτομα): • Δυσανεξία (π.χ. αλλοιωμένη γεύση) • Ναυτία, στοματική υποαισθησία (μούδιασμα του στόματος) • Φαρυγγική υποαισθησία (μούδιασμα του λαιμού). **Όχι Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 100 άτομα):** Έμετος, διάρροια, δυσπεψία, κοιλιακός πόνος, ξηροστομία. **Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 1.000 άτομα):** • Αντιδράσεις υπερευαισθησίας • Εξάνθημα, κνίδωση • Στομαχικός καούσος, ξηρότητα φάρυγγα. **Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):** Αναφυλακτικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης αναφυλακτικής καταπληξίας, αγγειοοιδήματος (ταχεία ανάπτυξη διόγκωσης του δέρματος, του υποδόριου ιστού, των βλεννογόνων ή των υποβλεννογόνων ιστών) και κνισμού. Σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένου πολύμορφου ερυθρήματος, συνδρόμου Stevens-Johnson/τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης και οξείας γενικευμένης εξανθηματικής φλυκταίνωσης). Βρογχόσπασμος (ως σύμπτωμα αντίδρασης υπερευαισθησίας). Υπήρξαν αναφορές σοβαρών δερματικών αντιδράσεων που αχετίζονται με τη χορήγηση υδροχλωρικής αμβροξόλης. Εάν εμφανιστεί δερματικό εξάνθημα (συμπεριλαμβανομένων βλαβών στις βλεννογόνους μεμβράνες όπως στο στόμα, το λαιμό, τη μύτη, το μάτι, τα γεννητικά όργανα), σταματήστε τη χρήση υδροχλωρικής αμβροξόλης και επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών: Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: 213 2040380/337, Φαξ: 210 6549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς φυλάσσεται το Abrobion: Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. Να μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα ακουμπιά. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες. Τι περιέχει το Abrobion
Σιρόπι 15 mg/5ml: - Η δραστική ουσία είναι υδροχλωρική αμβροξόλη. Τα 5 ml περιέχουν 15 mg υδροχλωρικής αμβροξόλης. - Τα άλλα συστατικά είναι: Hydroxyethylcellulose, Sorbitol solution 70% (E420), Glycerol solution 85%, Benzoic acid, Saccharin sodium, Cherry flavour, Menthol, Propylene glycol, Water purified.

Σιρόπι 30 mg/5ml: - Η δραστική ουσία είναι υδροχλωρική αμβροξόλη. Τα 5 ml περιέχουν 30 mg υδροχλωρικής αμβροξόλης. - Τα άλλα συστατικά είναι: Hydroxyethylcellulose, Sorbitol solution 70% (E420), Glycerol solution 85%, Benzoic acid, Saccharin sodium, Cherry flavour, Menthol, Propylene glycol, Water purified.

Εμφάνιση του Abrobion και περιεχόμενο της συσκευασίας: Το Abrobion Σιρόπι 15 mg/5ml διατίθεται σε χάρτινο κουτί που περιέχει σκουρόχρωμη γυάλινη φιάλη όγκου 125 ml με πλαστικό πώμα ασφαλείας και δοσμετρικό κουταλάκι. Το Abrobion Σιρόπι 30 mg/5ml διατίθεται σε χάρτινο κουτί που περιέχει σκουρόχρωμη γυάλινη φιάλη όγκου 125 ή 200 ml με πλαστικό πώμα ασφαλείας και δοσμετρικό κουταλάκι. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι περιεκτικότητες ή/και οι συσκευασίες.

help
pharmaceuticals

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός: HELP A.B.E.E.
Βαλαωρίτου 10, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ.: 210 2815353



LOGISCOOP
PANSYFA AEE

Αποκλειστική διάθεση: LOGISCOOP PANSYFA AEE
Γούναρη 219 & Τυρταίου 37, 166 74 Γλυφάδα, Τηλ.: 210 9645223

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 24-2-2017.

9.8x24 cm διασταση οδηγίας

702009-3